
Grundlagen

Blutversorgung, Hirnhüllen und Ventrikelsystem

David P. Wolfer
Institut für Bewegungswissenschaften und Sport, D-HEST, ETH Zürich
Anatomisches Institut, Medizinische Fakultät, Universität Zürich

377-0107-00 Nervensystem / Anatomie, Fr 15.11.2024 14:15-16:00

Lernziele dieser Anatomievorlesung: Studierende können ...

- **Merken und Erinnern**

1. gewebliche Zusammensetzung und Schichtenbau der Hüllen des ZNS wiedergeben
2. Gliederung, Begrenzung und Verbindungen der inneren und äusseren Liquorräume wiedergeben
3. Aufbau und Lokalisation von Plexus choroideus und Arachnoidalzotten wiedergeben
4. Verlauf und Versorgungsterritorien wichtiger Arterien des Vertebralis- und Karotis-Systems, Aufbau des Circulus arteriosus cerebri wiedergeben
5. die Elemente des oberflächlichen und tiefen Venensystems des Gehirns und der Sinus durae matris aufzählen
6. strukturelle Besonderheiten intrazerebraler Blutgefässe definieren und die Strukturelemente der Bluthirnschranke nennen

- **Verstehen und Anwenden**


1. mechanische und nicht-mechanische Funktionen der Hüllen des ZNS beschreiben
2. die strukturellen Grundlagen der Kompartimentgrenzen des extrazellulären Milieus des ZNS erläutern
3. das Prinzip der Liquorproduktion und -Resorption und der damit verbundenen Liquorbewegungen darlegen
4. sich den räumlichen Zusammenhang zwischen dem Verlauf zerebraler Arterien und der Ausdehnung ihrer Versorgungsgebiete vorstellen
5. sich den räumlichen Zusammenhang zwischen dem Verlauf zerebraler Venen und der Ausdehnung ihrer Drainagegebiete vorstellen
6. die strukturellen Grundlagen der Zusammenarbeit von Liquor- und Lymphsystem bei der Drainage des Extrazellulärraums im ZNS darlegen
7. die Konsequenzen von Blutgefässverschlüssen im Gehirn anhand von Beispielen erläutern

Fakultative Lernmaterialien für diese Vorlesung

- Lehrbuch: Trepel, «Neuroanatomie»
 - 11 Blutversorgung des Gehirns
- LernAtlas: Prometheus
«Kopf, Hals und Neuroanatomie»
B Neuroanatomie
 - 1.5 Nervensystem in Situ
 - 1.9 Blutversorgung von Gehirn und Rückenmark
 - 4.1-3 Hirn- und Rückenmarkshäute
 - 5.1-4 Liquorräume
 - 10.1-10 Blutgefäße des Gehirns
- Studiensammlung
 - Studiensaal I,
Vitrine 4: Frontalschnitte Kopf
 - Studiensaal II,
Sagittalschnitte durch den Kopf (beim Fenster)
 - Studiensaal II,
Vitrine 41: Hirnbasis mit Arterien
 - Studiensaal II,
Vitrine 42: Seitenventrikel, 43 4. Ventrikel, 44 3. Ventrikel
 - Studiensaal II,
Vitrine 50: Hirnhäute und Blutversorgung des Kopfes

Äussere Liquorräume, Hirn- und Rückenmarkshäute

- Funktionen
 - mechanischer Schutz (Bindegewebe & Flüssigkeit)
 - arachnoidale Stoffwechselbarriere (Tight Junctions)
 - Immunorgan (+ Knochenmark des Schädels, Plexus Choroideus), ergänzt Mikrogliazellen im Nervengewebe des ZNS
- Pachymeninx (harte Hirn- und Rückenmarkshaut)
 - Dura mater: aussen straffes kollagenes Bindegewebe (Stratum fibrosum) mit Blut- und Lymphgefässen, innen fragiles lockeres mehrschichtiges Plattenepithel (Neurothel, Stratum neurotheliale)
 - Schädel: Stratum fibrosum verwachsen mit Periost, ausser bei Durasinus und Durasepten (Falx cerebri, Tentorium cerebelli)
 - Spinalkanal: freier Durasack, umgeben von Epiduralraum
- Leptomening (weiche Hirn- und Rückenmarkshaut)
 - Arachnoidea mater: aussen arachnoidale Barriere-Schicht mit Tight Junctions (Epithel), innen Stroma (lockeres Bindegewebe)
 - Pia mater: lockeres Bindegewebe, über Basallamina in Kontakt mit durchlässiger Membrana limitans gliae des ZNS-Nervengewebes
 - dazwischen Subarachnoidalraum: Liquor cerebrospinalis und feine Trabekel der Arachnoidea (Vertäuung), ausgekleidet durch Leptomening-Mesothel (einschichtiges Plattenepithel, Immunzellen)



Innere Liquorräume

- **Ventrikel (weit)**


- Ventriculus lat. (Lv) im Telencephalon: ausgehend von Pars centralis (Pc)(→ Parietallappen): Cornu ant. (Ca) (→ Frontallappen), post. (Cp)(→ Okzipitallappen), temporal inf. (Ci)(→ Temporallappen)
- Ventriculus tertius (3v) im Diencephalon
- Ventriculus quartus (4v) in Medulla oblongata und Pons (Boden rautenförmig = Fossa rhomboidea)

- **Verbindungen / Kanäle (eng)**

- Foramina Monroi (Mo), Aqueductus cerebri (Aq) im Mesencephalon, Canalis centralis (Cc) des Rückenmarks
- Foramina Magendie (Ma) et Luschkae (Lu): einzige direkte Verbindungen zu Subarachnoidalraum


- **Auskleidung: Ependym**

- ca. 95% Oberfläche: einschichtiges Epithel aus Gliazellen mit Kinozilien, ohne Tight Junctions: Interzellularraum durchlässig (aber: Tight Junctions im Endothel der Kapillaren des ZNS-Nervengewebes → Blut-Hirn-Schranke)
- Ependym ohne Basallamina direkt auf lockerer und durchlässiger (Aquaporin4!) Membrana limitans gliae



Liquorproduktion

- Liquor 4x täglich ausgetauscht
 - Totalvolumen ca. 150 ml
 - Täglich ca. 600 ml durch Plexus choroideus sezerniert
- Plexus choroideus
 - ca. 5% der Ventrikeloberfläche statt Ependym
 - alle Ventrikel (Seitenventrikel ohne Cornu ant. et post.), fehlt im Aqueductus cerebri & im Can. centralis
 - starke Zottenbildung → Ventrikellichtung, Befestigung und Übergang zu Ependym = 2 Tánien pro Plexus
 - tiefer Schlitz in Gehirnwand: Ausläufer der Pia mater reicht von aussen als Tela choroidea bis Basallamina und basale Membran des Plexusepithels, dessen apikale Membran steht in Kontakt mit Liquor im Ventrikel
 - Tela choroidea = Bindegewebe mit Immunzellen, zahlreichen Blutgefässen, Kapillaren mit fenestriertem Endothel ohne Tight Junctions (≠ Blutkapillaren der übrigen Pia mater)
 - Plexusepithel typisches Transportepithel: aktiver transzellulärer Transport + parazelluläre Abdichtung durch Tight Junctions (Blut-Liquor-Schranke), apikale Oberflächenvergrößerung, basale Membranfalten (basales Labyrinth) mit Mitochondrien




Liquorresorption & Zirkulation

- Liquorresorption

- im Gleichgewicht mit Liquorsekretion, aus Subarachnoidalraum in durale Venen oder Lymphgefäße: Dura mater und Arachnoidea stellenweise stark ausgedünnt und ohne Tight Junctions
- Arachnoidalzotten → Blut: Arachnoidea ± zottig nach aussen gestülpt, Kontakt mit Sinus durae matris (Pacchioni-Granulationen am Sinus sagittalis superior im Scheitelbereich) oder epiduralem Venengeflecht (Duratrichter der Spinalnerven)
- auch ohne Zottenbildung stellenweise starke Annäherung der Arachnoidea an Lymphgefäße der Dura mater (va Schädelbasis bei Austritt der Hirnnerven) und im Epiduralraum

- Komplexe Liquorbewegungen

- Massenfluss Seitenventrikel → 3. Ventrikel → Aqueductus → 4. Ventrikel → Subarachnoidalraum → Arachnoidalzotten
Behinderung führt zu Stau und Druckanstieg (Hydrocephalus)
- Pendelbewegung 4. Ventrikel ↔ Zentralkanal
- ventrikuläre Mikrozirkulation durch Zilienschlag des Ependyms
- Austausch (va im Tiefschlaf) Liquorräume ↔ Nervengewebe via Ependym, Pia und via **glymphatisches System** (perivaskuläre Räume zwischen Membrana limitans Gliae und intrazerebralen Blutgefäßen als Ersatz für die im Nervengewebe fehlenden **Lymphgefäße**)



Arterielle Blutversorgung von Telencephalon und Diencephalon

■ Karotis-System


- A carotis int (ACI): Eintritt durch Canalis caroticus, Karotissiphon im Sinus cavernosus, A choroidea anterior (3) entlang Tractus opticus, Endäste A cerebri anterior (1) und media (2). Aus A cerebri media: Aa centrales anterolaterales (4) = lenticulostriatae
- versorgt Frontal- und Parietallappen, Teile des Temporallappens, Basalganglien, Capsula interna (Risikozone: Hemiplegie!), Teile des Diencephalon (via A choroidea ant auch Corpus geniculatum laterale)

■ Vertebralis-System

- Aa vertebrales (AV): Eintritt durch Foramen occipitale magnum, Vereinigung zu unpaarer A basilaris (AB)
- A cerebri post (5) versorgt Okzipitallappen, Teile des Temporallappens und dorso-kaudales Diencephalon


■■ Circulus arteriosus cerebri (Willisii)

- A communicans ant (6), Aa communicantes post (7): normal wenig durchblutet, Erweiterung bei langsamer Stenose eines Zuganges (über Wochen, Monate)
- Abgänge des Circulus arteriosus sind Endarterien, Verschluss bewirkt Infarkt des Versorgungsgebiets



Arterielle Blutversorgung von Cerebellum und Hirnstamm

- Cerebellum + Pedunculi cerebellares
 - Aa inf post (8), inf ant (9), sup (10) cerebelli
- Mesencephalon
 - multiple Äste der A cerebri post (5): Hauptversorgung
 - A choroidea ant (3): laterale Teile von Tegmentum und Crus cerebri (einzigster Beitrag des Karotis-Systems!)
 - A sup cerebelli (10): Teile des Colliculus inf
- Pons
 - Aa pontis med & lat (11) aus A basilaris (B): sektorweise medial und basolateral (Pars basilaris und Tegmentum)
 - A sup cerebelli (10): Gebiet um Pedunculus cerebellaris sup, A inf ant cerebelli (9): Gebiet um Pedunculus cerebellaris med
- Medulla oblongata
 - Rr medullares (12) va. aus A spinalis ant (13), zT. aus Aa vertebrales: sektorweise medial und basolateral
 - Aa inf post cerebelli (8) und vertebralis (AV): dorsolaterales Gebiet um Pedunculus cerebellaris inf bis Ncc olivares inf



Venöser Abfluss aus dem Gehirn

- grosse Variabilität, viele Anastomosen
- Oberflächlicher venöser Abfluss
 - Grosshirnrinde + 1-2 cm weisse Substanz, Teile des ventralen Hirnstamms, Teile des Kleinhirns
 - oberflächliche Gehirnvenen via Brückenvenen über Subarachnoidalraum → Sinus durae matris = klappenlose Blutleiter mit fester Wand aus Dura und Periost, Endothel, kaum Muskulatur
- Tiefer venöser Abfluss
 - Hippocampus & Sockel des Grosshirns, Teile Cerebellum, Diencephalon, Grossteil Hirnstamm
 - Blut aus tiefem Venensystem gesammelt in unpaarer V cerebri magna = V Galeni, aus dieser → Sinus rectus
- Abfluss aus Schädel
 - Hauptweg → V jugularis interna, alternativ → Pl venosus vertebralis internus, oder via Vv emissariae → Kopfhautvenen
 - via Vv ophthalmica sup & inf und Pl pterygoideus auch Einstrom von venösem Blut aus Gesichtsregion ins Schädelinnere: Ausbreitung von Infektionen!

